


A.S.L. 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

**N. 30 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE
SANITARIO-INFERMIERE**

QUESTIONARIO - 3

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, located in the lower-left quadrant of the page.

ESTRAZIONE

001. Quali sono i 4 principi fondamentali in bioetica:

- A) Principio di autonomia, principio di non-maleficenza, principio di beneficenza, principio di giustizia.
- B) Principio di autarchia, principio di non-maleficenza, principio di beneficenza, principio di giustizia.
- C) Principio di autonomia, principio di non-maleficenza, principio di beneficenza, principio di equità.

002. Quale dei seguenti è un sistema valido di revisione delle linee guida:

- A) Agree.
- B) Fmea.
- C) RCA.

003. Quali di questi indicatori misurano la qualità dell'assistenza infermieristica?:

- A) Conformità, documentazione, esito, infezioni.
- B) Conformità, documentazione, terapia, infezioni.
- C) Conformità, documentazione, esito, aderenza terapeutica.

004. Le dimensioni della salute sono:

- A) Fisica, psichica, emotiva, relazionale, spirituale, sociale.
- B) Fisica, psichica, emotiva, relazionale, emozionale, sociale.
- C) Fisica, psichica, emotiva, relazionale, religiosa, sociale.

005. L'acronimo FMEA è riferito a:

- A) Failure Mode Effect Analysis.
- B) Failure Mode Effect Assessment.
- C) Failure Method Effect Analysis.

006. Il dolore del bambino fino a 7 anni è valutabile utilizzando la seguente scala:

- A) Poker-chip tool.
- B) InfantPain Scale.
- C) Children's BehavioralPain Scale.

007. La vomica è definibile come :

- A) Emissione dalla bocca di materiale purulento proveniente dalle vie respiratorie.
- B) Emissione dalla bocca di materiale purulento proveniente dalla via gastrica.
- C) Emissione dalla bocca di materiale purulento proveniente da caverne tonsillari.

008. Lo shock distributivo può essere definito come:

- A) Shock ipovolemico non emorragico.
- B) Shock settico non emorragico.
- C) Shock ipovolemico emorragico.

009. La clearance della creatinina deve essere effettuata su un campione:

- A) Sangue intero + urine 24 ore.
- B) Solo sangue intero.
- C) Solo urine 24 ore.

010. La cannula di guedel è necessaria quando :

- A) Alla retroversione della lingua in soggetto incosciente.
- B) Il paziente è in arresto respiratorio.
- C) E' necessario intubare il paziente.

011. Si identifica il near misses come:

- A) Un evento che potrebbe aver determinato conseguenze avverse che invece non sono avvenute.
- B) Un quasi-evento potenzialmente letale per il paziente.
- C) Un evento che potrebbe determinare la morte dell'individuo.

012. Il cortisone fu isolato da:

- A) Calvin Kendall.
- B) Alexander Fleming.
- C) Jhon Paul Jones.

013. L'uso della pillola progestinica protegge dal:

- A) Carcinoma ovarico.
- B) Carcinoma Collo dell'utero.
- C) Citomegalovirus.

014. Una bombola contenente di azoto ha l'ogiva superiore di colore:

- A) Nero.
- B) Bianco.
- C) Blu.

015. 1000 ml di latte ovino contengono in media:

- A) 680 - 700 calorie.
- B) 570 - 600 calorie.
- C) 790 - 820 calorie.

016. Per ematemesi si intende:

- A) Presenza di sangue nel vomito.
- B) Presenza di albumine nel sangue.
- C) Presenza di corpi chetonici emorragici nel succo gastrico.

017. La posizione laterale di sicurezza di un paziente è indicata in caso di:

- A) Perdita di coscienza.
- B) Traumi degli arti inferiori.
- C) Frattura della colonna vertebrale.

018. E' un disturbo della produzione delle urine:

- A) Nessuna delle altre risposte.
- B) Ritenzione urinaria.
- C) Disuria.

019. In un flacone da 1000 ml di soluzione fisiologica sono contenuti 9 g di NaCl; quanti mg di NaCl sono contenuti in 1/3 di flacone?

- A) 3006 mg.
- B) 3,006 mg.
- C) 2900 mg.

020. In caso di ostruzione da corpo estraneo delle vie aeree superiori all'emogasanalisi si rileva:

- A) Ipossiemia e ipercapnia.
- B) Ipossiemia.
- C) Ipercapnia.

021. L'infermiere "garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche" attraverso:

- A) Una corretta preparazione, conservazione e somministrazione del farmaco.
- B) Una corretta prescrizione, preparazione e conservazione del farmaco.
- C) Una corretta conservazione e preparazione del farmaco.

022. Nella respirazione si definisce volume corrente:

- A) La quantità di aria che si inspira e si espira durante un atto respiratorio normale.
- B) La quantità di aria inspirata.
- C) La quantità di aria espirata.

023. L'ossimetro misura:

- A) I valori di SaO₂.
- B) La percentuale di CO₂.
- C) La frequenza ventilatoria.

024. Prima di eseguire un'iniezione sottocutanea è necessario:

- A) Valutare lo spessore del tessuto adiposo.
- B) Favorire il rilassamento muscolare.
- C) Indossare guanti sterili.

025. La prescrizione di un farmaco deve contenere:

- A) Dati anagrafici del paziente - Nome del farmaco - Quantità da somministrare - Via di somministrazione - Orario di somministrazione - Firma del medico.
- B) Dati anagrafici del paziente - Nome del farmaco - Quantità da somministrare - Via di somministrazione - Orario di somministrazione - Diagnosi.
- C) Dati anagrafici del paziente - Quantità da somministrare - Via di somministrazione - Orario di somministrazione - Diagnosi - Firma del medico.

026. Cosa si intende per feci ipocoliche:

- A) Feci molto chiare.
- B) Feci non composte.
- C) Feci con presenza di ossiuri.

027. Quale posizione deve assumere il paziente per consentire la raccolta di succo gastrico?

- A) Decubito laterale sinistro.
- B) Decubito laterale destro.
- C) Posizione Trendelenburg.

028. La scala di Charriere definisce:

- A) Il calibro del catetere.
- B) Il materiale di cui è fatto il catetere vescicale.
- C) Le caratteristiche dell'estremità prossimale.

029. L'urina con colore giallo scuro - marrone ci indica la presenza di:

- A) Pigmenti biliari.
- B) Pigmenti melonici.
- C) Sangue digerito.

030. La raccolta frazionata delle urine è:

- A) Una raccolta delle urine che viene fatta ad intervalli costanti nel tempo.
- B) Una raccolta delle urine emessa nello spazio delle 24 ore.
- C) Una raccolta delle urine che viene fatta ogni 2 ore.

LEPENA GIATO ORSATO

CAPPUCCI ARMANDO

Giandomenico Pappalardo

GIULIA ANTONUCCI

Giulio Pappalardo

NON ESTIMATTA ORE 09.30

MANUEL MOGESSO

Manuel Mogesso

MARIANA TOFFALI

Mariana Toffali

LARA PARRERADONNA

Lara Parreradonna

NON ESTIMATTA ORE 14.30